



**Picfen®**

Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen  
Capsule

**پیکفن®**

استامینوفن / کافئین / ایبوپرو芬  
کپسول

#### مطلوب لازم برای بیمار:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در رمارات مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری فرمایید.

#### راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

۱. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید.

— در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو یا سایر داروهای مشابه، غذاها، رنگها و مواد محافظ.

— در صورتی که هرگونه داروی دیگری را مصرف می‌کنید یا قصد استفاده از هرگونه داروی بدون نسخه را دارد.

۲. در صورت ابتلاء به هر گونه بیماری خصوصاً نارسایی کبدی یا کلیوی، زخم معده، هیپرتیروئیدیسم، افزایش فشار خون، آریتمی قلبی یا سایر بیماریهای قلبی-عروقی و تشنج.

#### مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو در افراد بزرگسال بدن صورت می‌باشد. با توجه به اینکه کپسولها حاوی ۳ ماده موثره هستند دوز دارو باید با توجه به هر ۳ ماده موثره

تنظیم شود. دوز روزانه دارو ۳ کپسول می‌باشد.

#### توجه:

صرف زیاد استامینوفن می‌تواند باعث سمیت کبدی شود.

#### صرف در دوران بارداری و شیردهی:

مطالعات دقیق و کنترل شده ای در زنان باردار در مورد اثرات این دارو صورت نگرفته است و به همین خاطر

این دارو در صورتی باید در زنان باردار مصرف گردد که منافع آن در مقابل مضر آن سنجدیده گردد.

صرف این دارو در مادران شیرده با دوزهای معمول بلامانع است.

#### عارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

عارض این دارو مجموعه ای از عوارضی است که ممکن است به صورت تک تک توسط مواد موثره این دارو ایجاد شود. این عوارض عبارتند از: ائوزینوفیلی، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، لکوپنی، پانسیتوپنی، نوتروپنی، آگرانولوسیتوز، راشهای پوستی، آسیب کبدی و کلیوی، آسم، تحریک دستگاه گوارش، تحریک سیستم اعصاب مرکزی، تهوع،

استفراغ، درد شکم، اسهال، بی خوابی، سردرد، تشویش، لرزش، طپش قلب، تشنج و پانکراتیت.

#### هشدارها:

\* از افزایش ناگهانی دوز دارو بدون نظر پزشک جداً خودداری نمائید.

\* در صورت داشتن سابقه هرگونه تشنج یا تحت درمان بودن با داروهای ضد تشنج حتماً پزشک خود را مطلع فرمائید.

\* همه با فآو، دهه، حاده، استامینوف: مصرف نشود.